

استاندارد ملی بذر کلم

استاندارد مزرعه تولید بذر کلم

گواهی شده	مادری	سوپر الیت	
۲	۲	۲	حداقل تناوب (سال)
۱۰۰۰	۱۴۰۰	۱۶۰۰	حداقل فاصله ایزولاسیون (متر)
۱/۱۰۰۰	۱/۲۰۰۰	۱/۲۰۰۰	حداکثر بوته سایر ارقام (درصد)
*	*	*	حداکثر بوته علف های هرز
**	**	**	آفات
			بیماریهای بذرزاد (درصد)
۱	۰/۵	۰/۱	ویروس ها <i>Turnip mosaic virus</i>
۱	۰/۵	۰/۱	پروکاریوت ها <i>Xanthomonas campestris</i> <i>Pv. Campestris</i> <i>Pseudomonas sp.</i>
5/0	2/0	۰/۱	قارچ ها <i>Albogo candida</i> <i>Alternaria brassica</i>
-	-	-	نماتد <i>Dytilenchus dipsaci</i>

* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.
تعداد بذر علفهای هرز هم خانواده از ۵ عدد بیشتر نباشد.

** در صورت وجود بیماریهای ویروسی در منطقه در کلاسهای سوپر الیت و مادری ضدعفونی بذر با حشره کش توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات ضروری و در کلاس گواهی شده اختیاری است.

استاندارد بذر کلم

گواهی شده	مادری	سوپر البیت	
۹۹	۹۹	۹۹	حداقل خلوص فیزیکی (در صد)
۱	۱	۱	حداکثر مواد جامد (در صد)
۰/۲۵	۰/۱	۰/۰۵	بذر سایر محصولات (درصد)
۰/۲۵	۰/۱	۰/۰۵	حداکثر بذر سایر ارقام (درصد)
*	*	*	حداکثر تعداد بذر علف های هرز
۸۵	۸۵	۸۵	حداقل قوه نامیه (درصد)
۷	۷	۷	حداکثر رطوبت بذر(درصد)
			بیماریهای بذرزاد (درصد)
-	-	-	<i>Turnip mosaic virus</i> ویروس ها
۰/۵	۰/۱	۰/۰۵	<i>Xanthomonas campestris</i> <i>Pv. Campestris</i> <i>Pseudomonas sp.</i> پروکاریوت ها
-	-	-	<i>Albogo candida</i> <i>Alternaria brassica</i> قارچ ها