

استاندارد ملی بذر چغندرلبویی

الف) استاندارد مزرعه چغندرلبویی

گواهی شده	مادری	
۳	۴	حداقل تناوب (سال)
۱۰۰۰	۱۰۰۰	حداقل فاصله مزرعه از سایر مزارع (متر)
۰	۰	حداکثر سایر ارقام (بوته)
۰	۰	علف های هرز غیر مجاز*
۱	۱	حداکثر تعداد بوته سایر علف های هرز (در متر مربع)
-	-	آفات**
		بیماری های بذرزاد
۰	۰	قارچ ها <i>Sercospora beticola</i> <i>Phoma betae</i>

* توصیه فنی مزرعه در مورد همه گیاهان وجینی پاک بودن مزرعه از علف های هرز برای سهولت بازرسی مزرعه می باشد.

** در صورت بالا بودن شدت آلودگی و آفات در مزرعه بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.

- مبارزه با آفات به ویژه ناقل بیماری ها براساس دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات ضروری است. به طور مثال:
- شته سیاه باقلا (*Aphis fabae*): زمانی که در خرداد ماه به طور میانگین روی هر گیاه تعداد ۱۰ شته (یا ۲۵٪ گیاه دارای شته) باشد سم پاشی صورت می گیرد.
- شته شبز هلو (*Myzus persicae*): در صورتی که در اواخر خرداد ماه بیش از ۵ عدد یا در نیمه تیر بیش از ۸ عدد شته روی گیاه باشد، سم پاشی صورت می گیرد.

در مناطقی که تولید بذر چغندر قند انجام می شود، تولید بذر چغندر لبویی مجاز نمی باشد.

ب) استاندارد بذر چغندرلبویی

گواهی شده	مادری	
۹۸	۹۸	حداقل خلوص فیزیکی (درصد)
۲	۲	حداکثر مواد جامد (درصد)
۰	۰	حداکثر تعداد بذر سایر محصولات (در ۵۰۰ گرم)
۰	۰	حداکثر تعداد بذر علف های هرز غیر مجاز (در ۵۰۰ گرم)
۷۰	۶۵	حداقل قوه نامیه (درصد)
۸	۸	حداکثر رطوبت بذر (درصد)
		بیماری ها بذرزاد
۰	۰	<i>Phoma betae</i> <i>Cercospora beticola</i>
		قارچ ها