

بسمه تعالیٰ

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

.....تاریخ:

«فرم استاندارد پیشنهادی»

عنوان استاندارد: (تدوین/ بازنگری):

استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستانهای به



بسمه تعالی

استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستانهای به

تعاریف:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیری نهال (Basic & Pre-basic)

هسته های اولیه: مواد گیاهی محدودی از ارقام تجاری هستند که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده و در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.

پیش تکثیر: مواد گیاهی برگرفته از هسته های اولیه بوده که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده است. این طبقه به عنوان حلقة بین هسته های اولیه و باغات مادری قرار دارد و مواد گیاهی مورد استفاده برای احداث باغ مادری از آنها تهیه می شود. این مواد گیاهی در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.

توضیحات:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید عاری از کلیه پاتوژنهای گیاهی از جمله ویروسهای *Tomato ringspot Nepovirus*

Apple stem pitting Foveavirus *Apple chlorotic leaf spot Trichovirus* (ACLSV), (ToRSV)

Pear Decline (ASPV)، *Faïtoپلاسمها* (ASGV) و باکتریهای

Erwinia amylovora) و باشد.

۲. هسته های اولیه و پیش تکثیری باید در اسکرین هاوشهای مجزا در خاکی کاملاً استریل در گلدان و بدون تماس با خاک اسکرین

هاوس نگهداری شوند.

۳. جهت جداسازی گلدانهای حاوی هسته های اولیه و پیش تکثیری، کف اسکرین هاووس باید حداقل تا عمق ۸۰ سانتیمتر از سنگریزه

پوشیده شده و گلدانها بر روی سکوهای بتی یا پلاستیکی نگهداری شوند.

۴. به غیر از هسته های اولیه و پیش تکثیری، گیاهان دیگری نباید در اسکرین هاووس موجود باشند. به شعاع ۲۰ متری اسکرین هاووس

هم نباید گیاهی موجود باشد.

۵. ضمن ارزیابی چشمی مرتب از نظر سلامت در برابر بیماریهای خاکبرد و هوابرد نظیر

Rosellinia necatrix, *Rhizobium radiobacter*, *Phytophthora* spp., *Armillaria mellea*

به بیماری ذکر شده در بند ۱ مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند.

۶. با توجه به انتقال تعدادی از ویروسهای گیاهی از طریق بذر، هسته های اولیه و پیش تکثیری نباید به مرحله گلدهی برسند.

۲. درختان مادری (Mother Blocks):

به باغات گیاهانی از ارقام تجاری محصولات سردرختی باگبانی با اصالتی معلوم و کاملاً سالم اطلاق می شود که تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در مکانی با فاصله ایزو لایسنس استاندارد کاشته شده و از مواد گیاهی آنها برای تولید نهال استفاده می شود.

توضیحات:

۱. درختان مادری باید عاری از ویروسهای *Pear*, *ASGV*, *ACLSV*, *ToRSV*, *Faïtoپلاسمها* (از جمله

(Decline) و باکتریهای سخت رشد و آوندی از جمله آتشک دانه داران (*E. amylovora*) باشند.

۲. پایه و پیوندک درختان مادری از مواد پیش تکثیر تهیه می شود.



۳. باغات مادری در بیرون از گلخانه در خاک طبیعی باغ که عاری از نماندهای *Longidorous spp.*, *Xiphinema spp.*, *Armillaria* و *Rosellinia necatrix* و قارچهای *Pratylenchus vulnus*, *P. penetrans*, *Meloidogyne spp.*, *Rhizobium radiobacter* و *Phytophthora spp.* بوده و به تایید سازمان حفظ نباتات رسیده، احداث می شوند.
۴. تعیین فاصله حریم امن (فقدان منابع گیاهی آلوده) برای باغات مادری به نوع استفاده از باغ، بیماریهای قابل انتقال و برد پرورا زیست را تعیین می شود.
۵. جهت اطمینان از عدم انتقال بیماریهای خاکزی، باید آبیاری از نوع تحت فشار باشد و توسط لوله های آبیاری مستقیما از منبع تامین آب به زمین اصلی منتقل گردد.
۶. همه درختان مادری ضمن ارزیابی چشمی مرتب (۲-۳ بار در سال در اوایل بهار و اواسط تابستان) از نظر سلامت عمومی (عدم وجود علائم بیماری)، باید سالیانه حداقل یک بار از نظر عدم آلودگی به ACLSV و هر پنج سال یکبار از نظر عدم آلودگی به پاتوژنهای ذکر شده در بند ۱ مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند. در صورت مشاهده آلودگی (باستثناء آلودگی به *E. amylovora*) ضروری است درخت (درختان) آلوده حذف و با درخت سالم جایگزین شود. با توجه به اینکه باکتری *E. amylovora* به طور آندوفیت میکن است وجود داشته باشد، بررسی آزمایشگاهی این بیماری بشهاد نمی شود، فقط در صورت بروز علائم ضمن استفاده از سموم ضد باکتری، از درخت آلوده پیوند کردن تهیه نشود.
۷. با توجه به انتقال تعدادی از ویروسهای گیاهی از طریق بذر، باغات مادری بجز باغاتی که برای بذرگیری مورد استفاده قرار می گیرند، نباید به مرحله گلدهی برسند.

۳. نهال گواهی شده (Certified)

به نهالی اطلاق می شود که اصالت، سلامت و مشخصات ظاهری آن مطابق با استانداردهای مصوب بوده و مواد اولیه آن از باغات مادری تهیه می شود.

توضیحات:

۱. پایه و پیوند کردن باید متتجانس و از ارقام تجاری شناخته شده بوده و عمل پیوند در زمان مناسب انجام شده باشد.
۲. نهال گواهی شده باید عاری از ویروسهای *ToRSV* و *ACLSV* (Pear Decline), *R. Xiphinema* و نماندهای *Phytoplasma* قارچهای *A. necatrix*, *A. mellea*, *P. radiobacter*, *E. amylovora*, *M. hapla*, *M. arenaria*, *M. javanica*, *M. incognita*, *L. longidorus* spp., *P. vulnus*, *P. penetrans* باشد.

۳. نهالستانها باید از سایر منابع آلودگی ۱۰۰۰ متر فاصله داشته باشند.



جدول ۱) بیماریهای قابل انتقال به

عامل بیماری	انتقال	دامنه میزبانی
<i>Tobacco ringspot 'nepovirus'</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد (Xiphinema spp.)، خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر (٪۳-۱۰۰)	بیش از ۱۷ خانواده گیاهی تک لبه ای و دولبه ای (شامل هسته داران، سیب، انگور، پاپایا، سویا، لوین، توتون، نعناع، شقایق، زنبق، گلابیول، شمعدانی، زبان گنجشک، Elderberry (sambucus spp.), Blueberry، American dogwood (Cornus florida)، Phaseolus spp.، Blackberry (Rubus fruticosus)، Chenopodium، Capsicum spp.، Petunia sp.، Vigna spp. spp.
<i>Apple chlorotic leaf 'spot trichovirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و هسته داران، خانواده های Chenopodiaceae و Leguminosaceae
<i>Apple stem pitting Foveavirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و خانواده های Amaranthacea، Chenopodiaceae، Cucurbitaceae، Pedaliaceae، Rosaceae، Solanaceae، Tetragniaceae
<i>Apple stem grooving capillovirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و خانواده های Aizoaceae، Amaranthacea، Chenopodiaceae، Cucurbitaceae، Labitaceae، Leguminosae، Rosaceae، Scrophulariacea، Solanaceae
<i>Phytophthora spp.'</i>	خاک آلوده، آب آلوده، قلمه های آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع
^۷ پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه <i>Armillaria mellea</i>	خاک و آب آلوده، نهال های آلوده، قطعات گیاهی آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع
^۸ پوسیدگی رزلینیایی ریشه <i>Rosellinia necatrix</i>	خاک و آب آلوده، نهال های آلوده، مواد گیاهی آلوده و ادوات کشاورزی	بسیار وسیع (۱۷۰ گونه گیاهی در ۶۳ جنس و ۳۰ خانواده)
<i>Meloidogyne spp.^۹</i> <i>M. hapla</i> <i>M. arenaria</i> <i>M. incognita</i> <i>M. javanica</i>	خاک	پلی فاز
^{۱۰} <i>Longidorous spp.</i>	خاک	پلی فاز
<i>Pratylenchus vulnus</i> ^{۱۱} <i>P. penetrans</i>	خاک	پلی فاز
^{۱۲} <i>Xiphinema spp</i>	خاک	پلی فاز
^{۱۳} <i>Phytoplasma</i> (Pear decline)	مواد گیاهی آلوده، زنجر کها	دانه داران
^{۱۴} <i>Erwinia amylovora</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران (سیب، گلابی، ازگیل، به، رز)
^{۱۵} <i>Rhizobium radiobacter</i>	خاک، مواد گیاهی آلوده	بسیار وسیع



توضیحات: ^۱ روش های ردیابی: الایرا و روش های بیولوژیک و در صورت نیاز روش های مولکولی

روش های ردیابی: بررسی ظاهری و در صورت نیاز تله گذاری و استفاده از محیط های کشت اختصاصی

^۲ روش های ردیابی: بررسی ظاهری اندام های هوایی، طوفه و ریشه

روش های ردیابی: استفاده از PCR با پرائمرهای یونیورسال

^۳ روش های ردیابی: استفاده از PCR و کشت روی محیط اختصاصی و روش های بیوشیمیایی

