

استاندارد مزرعه بامیه

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شده	مادری	سویر الیت			
۲	۲	۲	تناوب (حداقل سال)		
۲۰۰	۴۰۰	۴۰۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)		
۱/۱۰۰۰	۰	۰	سایر ارقام (حداکثر بوته)		
*	*	*	علف های هرز		
**	**	**	آفات سفید بالک ها ۱ سایر آفات ۲		
۱	۰	۰	Okra mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذرزاد (درصد)
۰/۵	۰/۵	۰/۱	Pseudomonas syringae	پروکاریوت ها	
۱	۰/۱	۰/۱	Fusarium oxysporum Colletotrichum sp.	قارچ ها	

توضیحات: حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.
 * توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.
 ** در صورت بالا بودن شدت آلودگی و آفات در مزرعه، بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.



استاندارد بذر بامیه

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شده	مادری	سوپر الیت			
۹۸	۹۹	۹۹	خلوص فیزیکی (حداقل در صد)		
۲	۱	۱	مواد جامد (حداکثر در صد)		
۵ عدد در کیلوگرم	۰	۰	بذر سایر محصولات		
۰	۰	۰	حداکثر بذر سایر ارقام		
۷۵	۷۵	۷۵	«حداقل قوه نامیه (درصد) بعلاوه بذور سخت		
۱۰	۱۰	۱۰	حداکثر رطوبت بذر (درصد)		
۰	۰	۰	عنف های هرز		
-	-	-	Okra mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذرزاد (درصد)
۰/۱	۰/۰۵	۰	Pseudomonas syringae	پروکاریوت ها	
۱	۰/۰۵	۰/۰۵	Fusarium oxysporum Colletotrichum sp.	قارچ ها	

* در صورت مشاهده بامیه وحشی حتما پاکسازی بعمل آید.

