

## استاندارد مزرعه کلم ها

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شد	مادری	سوپر الیت			
۲	۲	۲	تناوب (حداقل سال)		
۱۰۰۰	۱۴۰۰	۱۶۰۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)		
۱/۱۰۰۰	۱/۲۰۰۰	۱/۲۰۰۰	سایر ارقام (حداکثر بوته)		
*	*	*	علف های هرز - حداکثر تعداد بوته در مترمربع		
**	**	**	آفات		
۱	۰/۵	۰/۱	Turnip mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذرزاد (درصد)
۱	۰/۵	۰/۱	Pseudomonas sp.	پروکاریوت ها	
			Xanthomonas campestris		
			Pv. campestris		
۰/۵	۰/۲	۰/۱	Albogo candida Alternaria brassica	قارچ ها	
-	-	-	Dytilenchus dipsaci		

توضیحات: حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.

\* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.

\*\* در صورت بالا بودن شدت آلودگی و آفات در مزرعه، بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.



## استاندارد بذر کلم ها

طبقه بذری			عوامل	
گواهی شده	مادری	سوپر البیت		
۹۹	۹۹	۹۹	خلوص فیزیکی (حداقل در صد)	
۱	۱	۱	مواد جامد (حداکثر در صد)	
۰/۲۵	۰/۱	۰/۰۵	بذر سایر محصولات	
*	*	*	حداکثر بذر سایر علشهای هرز	
۰/۲۵	۰/۱	۰/۰۵	حداکثر بذر سایر ارقام	
۸۵	۸۵	۸۵	حداقل قوه نامیه (درصد)	
۷	۷	۷	حداکثر رطوبت بذر (درصد)	
-	-	-	Turnip mosaic virus	ویروس ها
۰/۵	۰/۱	۰/۰۵	Pseudomonas sp. Xanthomonas campestris Pv. campestris	پروکاریوت ها
-	-	-	Aibogo candida Alternaria brassica	قارچ ها
-	-	-	Dytilenchnus dipsaci	نماتدها

