



بسمه تعالیٰ

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

.....تاریخ:

### «فرم استاندارد پیشنهادی»

عنوان استاندارد: (تدوین / بازنگری):

استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستانهای گوجه



## استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستان های گوجه

تعاریف:

### ۱. هسته های اولیه و پیش تکثیری نهال (Basic & Pre-basic):

هسته های اولیه: مواد گیاهی محدودی از ارقام تجارتی هستند که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده و در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.  
پیش تکثیر: مواد گیاهی برگرفته از هسته های اولیه بوده که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده است. این طبقه به عنوان حلقه بین هسته های اولیه و باغات مادری قرار دارد و مواد گیاهی مورد استفاده برای احداث باغ مادری از آنها تهیه می شود. این مواد گیاهی در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.

توضیحات:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید عاری از کلیه پاتوژن های گیاهی بویژه ویروس های

*Prune dwarf Ilarvirus*, *Tobacco Plum pox Potyvirus (PPV)*, *Prunus necrotic ringspot Ilarvirus (PNRSV)*, *(PDV)*

*Apple chlorotic leaf spot Tomato ringspot Nepovirus (ToRSV)*, *ringspot Nepovirus (TRSV)* و

*Arabis mosaic Nepovirus (ArMV)*, *Apple mosaic Ilarvirus (ApMV)*, *Trichovirus (ACLSV)*

*Cherry leaf roll Nepovirus (CLRV)* باشد.

۲. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید در اسکرین هاوس های مجزا در خاکی کاملا استریل در گلدان و بدون تماس با خاک اسکرین هاوس نگهداری شوند.

۳. جهت جداسازی گلدان های حاوی هسته های اولیه و پیش تکثیری، کف اسکرین هاوس باید حداقل تا عمق ۸۰ سانتیمتر از سنگریزه پوشیده شده و گلدان ها بر روی سکوهای بتی یا پلاستیکی نگهداری شوند.

۴. به غیر از هسته های اولیه و پیش تکثیری، گیاهان دیگری باید در اسکرین هاوس موجود باشند. به شاعع ۲۰ متری اسکرین هاوس هم باید گیاهی موجود باشد.

۵. ضمن ارزیابی چشمی مرتبا از نظر سلامت در برابر پاتوژن ها و بیماری های خاکبرد و هوایبرد نظیر

*Rosellinia necatrix*, *Phytophthora spp.*, *Armillaria mellea*, *Verticillium dahliae*

عدم آلدگی به بیماری ذکر شده در بند ۱ مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند.

۶. با توجه به انتقال تعدادی از ویروس های گیاهی از طریق بذر، هسته های اولیه و پیش تکثیری باید به مرحله گلدهی برسند.

### ۲. درختان مادری (Mother blocks):

به باغات گیاهانی از ارقام تجاری محصولات سردرختی با غبانی با اصالتی معلوم و کاملا سالم اطلاق می شود که تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در مکانی با فاصله ایزولاسیون استاندارد کاشته شده و از مواد گیاهی آنها برای تولید نهال استفاده می شود.

توضیحات:



۱. درختان مادری باید عاری از ویروسهای APMV, ACLSV, ToRSV, TRSV, PPV, PNRSV, PDV باشد.
۲. پایه و پیوند که درختان مادری از مواد پیش تکثیر تهیه می شود.
۳. باغات مادری در بیرون از گلخانه در خاک طبیعی باع که عاری از نماتدهای *M.hapla*, *Meloidogyne arenaria*, *V.dahliae*, *R. necatrix*, *A. mellea* و قارچهای *Longidorous spp.*, *Xiphinema spp.* بوده و به تائید سازمان حفاظت بیانات رسیده، احداث می شوند.
۴. تعیین فاصله حریم امن (فقدان منابع آلوده گیاهی) برای باغات مادری به نوع استفاده از باع، بیماری های قابل انتقال و برد پروازی حشرات ناقل بستگی دارد. در مورد گوجه، حریم امن باغات ۱۰۰۰ متر تعیین میشود.
۵. جهت اطمینان از عدم انتقال بیماری های خاکزکی، باید آبیاری از نوع تحت فشار باشد و توسط لوله های آبیاری مستقیماً از منبع تامین آب به زمین اصلی منتقل گردد.
۶. همه درختان مادری ضمن ارزیابی چشمی مرتب (۲-۳ بار در سال در اوخر بهار و اواسط تابستان) از نظر سلامت عمومی (عدم وجود علائم بیماری) در برابر پاتوئن ها و بیماری های خاکبرد و هوابرد نظیر PPV, PNRSV, PDV و شانکریاکتریا، باید سالیانه یک بار از نظر عدم آلودگی به ویروس های *V. dahliae*, *A. mellea*, *R. necatrix*, *Phytophthora spp.*, *A. necatrix*, *Phytophthora spp.*, *A. dahliae* و هر پنج سال یکبار از نظر عدم آلودگی به ویروس های ToRSV, ACLSV, ApMV, ArMV, CLRV ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند. در صورت مشاهده آلودگی ضروری است درخت (درختان) آلوده حذف و با درخت سالم جایگزین شود.
۷. با توجه به انتقال تعدادی از ویروس های گیاهی از طریق پذر، باغات مادری بجز باغاتی که برای پذرگیری مورد استفاده قرار میگیرند، نباید به مرحله گلدهی برسند.

### ۳. نهال گواهی شده (Certified):

به نهالی اطلاق می شود که اصالت، سلامت و مشخصات ظاهری آن مطابق با استانداردهای مصوب بوده و مواد اولیه آن از باغات مادری

تهیه می شود.

توضیحات:

۱. پایه و پیوند که باید متجانس و از ارقام تجاری شناخته شده بوده و عمل پیوند در زمان مناسب انجام شده باشد.
۲. نهال گواهی شده باید عاری از ویروسهای ToRSV, PPV, PNRSV, PDV, *Pseudomonas syringae*, *M. arenaria*, *M. hapla*, *Xiphinema spp.*, *Pratylenchus vulnus*, *Longidorous spp.*, *R. necatrix*, *A. mellea*, *Phytophthora spp.*, *V. dahliae*, *M. incognita javanica* و قارچهای *M. incognita javanica* باشد.
۳. نهالستانها باید از سایر منابع آلودگی ۱۰۰۰ متر فاصله داشته باشند.



جدول ۱) بیماریهای قابل انتقال گوجه

عامل بیماری	انتقال	دامنه میزبانی
<i>Tobacco ringspot 'nepovirus</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد، ( <i>Xiphinema spp.</i> ) خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر (٪۳-۱۰۰)	بیش از ۱۷ خانواده گیاهی تک لپه ای و دولپه ای (شامل هسته داران، سیب، انگور، پایایا، سویا، لوپین، توتون، نعناع، شقایق، زنبق، گلابیل، شمعدانی، زبان گنجشک، <i>American Elderberry (sambucus spp.)</i> , <i>Blackberry</i> , <i>Blueberry</i> , <i>dogwood (Cornus florida)</i> , <i>Petunia</i> , <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Chenopodium spp.</i> , <i>Capsicum spp.</i> , sp.)
<i>Apple chlorotic leaf spot 'trichovirus</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و هسته داران، خانواده های <i>Chenopodiaceae</i> و <i>Legominoceae</i>
<i>'Apple mosaic ilarvirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و هسته داران، خانواده های رزاسه و کوکوریتاسه
<i>'Arabis mosaic nepovirus'</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد ( <i>Xiphinema spp.</i> ) خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر	اکثر تک لپه ایها و دولپه ایها (شامل تمشک، توت فرنگی، خیار، کاهو، کرفس، چغندر قند، رازک، تربیجہ کوهی، نرگس، شیدر سفید، مو، رز، <i>Forsythia intermedia</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Rhubarb (Rheum rhabarbarum)</i> )
<i>Cherry leaf roll 'nepovirus</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد ( <i>Xiphinema spp.</i> ) خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر	[ <i>Rhubarb (Rheum rhabarbarum)</i> , <i>Elderberry (sambucus spp.)</i> , <i>American elm (Ulmus Americana)</i> , <i>American dogwood (Cornus florida)</i> , <i>Blackberry (Rubus fruticosus)</i> ]
<i>Prune dwarf ilarvirus'</i>	مواد گیاهی آلوده، دانه گرده، بذر (بیش از ٪۸۰)	دامنه میزبانی وسیع (شامل هسته داران، کوکوریتاسه و در مجموع ۱۵ خانواده از دولپه ایها)
<i>Prunus necrotic ringspot ilarvirus'</i>	مواد گیاهی آلوده، دانه گرده، بذر (بیش از ٪۷۰)	دامنه میزبانی وسیع (شامل هسته داران، بادام، رز، رازک و در مجموع ۲۱ خانواده از دولپه ایها)
<i>Plum pox potyvirus'</i>	مواد گیاهی آلوده، شته ها، بذر	هسته داران، بادام، درختان زینتی
<i>Tomato ring spot virus'</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد ( <i>Xiphinema spp.</i> ) خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر	بیش از ۳۵ خانواده گیاهی متعلق به تک لپه ایها و دولپه ایها (شامل هسته داران، کوکوریتاسه، گیاهان زینتی، انگور، توتون، توت فرنگی، <i>Chenopodium</i> , <i>Phaseolus spp.</i> , <i>Blackberry</i> , <i>Raspberry</i> , <i>Petunia spp.</i> , <i>Vigna spp.</i> , spp.)
<i>Phytophthora spp'</i>	خاک آلوده، آب آلوده، قلمه های آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع



<i>V. dahliae</i> <sup>۶</sup>	خاک آلوده، آب آلوده، قلمه های آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع
<i>Armillaria mellea</i>	پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه <sup>۴</sup> خاک و آب آلوده، نهال های آلوده، قطعات گیاهی آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع
<i>Rosellinia necatrix</i>	پوسیدگی رزلینیایی ریشه <sup>۵</sup> خاک و آب آلوده، نهال های آلوده، مواد گیاهی آلوده و ادوات کشاورزی	بسیار وسیع (۱۷۰ گونه گیاهی در ۶۳ جنس و ۳۰ خانواده)
<i>Pseudomonas syringae</i> <sup>۶</sup> (شانکر باکتریایی)	خاک و آب آلوده، نهال های آلوده، مواد گیاهی آلوده و ادوات کشاورزی	دانه داران، هسته داران، دانه ریر، مرکبات، غلات، لگومینوزه و ...
<i>Meloidogyne hapla</i> <sup>۷</sup> <i>M. arenaria</i> <i>M. incognita</i> <i>M. javanica</i>	خاک	پلی فاز
<i>Longidorous</i> spp. <sup>۷</sup>	خاک	پلی فاز
<sup>۸</sup> <i>Pratylenchus vulnus</i>	خاک	پلی فاز
<sup>۹</sup> <i>Xiphinema</i> spp.	خاک	پلی فاز

توضیحات:

<sup>۱</sup> روش های ردیابی: الایزا و روش های بیولوژیک و در صورت نیاز روش های مو

روش های ردیابی: بررسی ظاهری و در صورت نیاز تله گذاری و استفاده از محیط های کشت اختصاصی

**۲- روش های ردیابی:** بررسی ظاهري و درصورت نیاز استفاده از محیط های کشت و آزمون خاک از نظر وجود میسلیوم و اسکلرولت

<sup>۷</sup> روش های ردیابی: بررسی ظاهری اندام های هوایی، طوقه و ریشه

روش های رد پایی؛ جداسازی از پافتهای گیاهی مشکوک

