

بسمه تعالیٰ

## استانداردهای سلامت هسته‌های اولیه، باغات مادری و نهالستان‌های عناب

### تعاریف:

#### ۱. هسته‌های اولیه و پیش تکثیری نهال (Basic & Pre-basic Stocks)

هسته‌های اولیه: مواد گیاهی محدودی از ارقام تجاری هستند که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده و در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می‌شوند.

پیش تکثیر: مواد گیاهی برگرفته از هسته‌های اولیه بوده که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده است. این طبقیه عنوان حلقه بین هسته‌های اولیه و باغات مادری قرار دارد و مواد گیاهی مورد استفاده برای احداث باغ مادری از آنها تبیه می‌شود. این مواد گیاهی در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می‌شوند.

### توضیحات:

۱. هسته‌های اولیه و پیش تکثیر باید عاری از کلیه پاتوژن‌های گیاهی سیستمیک از جمله *Fusarium solani* باشند.
۲. هسته‌های اولیه و پیش تکثیر باید در خاکی کاملاً استریل در گلدان و بدون تماس با خاک اسکرین هاووس نگهداری شوند.
۳. جهت جداسازی گلدانهای حاوی هسته‌های اولیه و پیش تکثیری، کف اسکرین هاووس باید حداقل تا عمق ۸۰ سانتیمتر از سنگریزه پوشیده شده و گلدانها بر روی سکوهای پتی با پلاستیک نگهداری شوند.
۴. به غیر از هسته‌های اولیه و پیش تکثیری، گیاهان دیگری باید در اسکرین هاووس موجود باشند. به شعاع ۲۰ متری اسکرین هاووس هم نباید گیاهی موجود باشد.
۵. هسته‌های اولیه و پیش تکثیری باید ضمن ارزیابی مرتب چشمی از نظر یماریهای هوایرد و خاکبرد باید سالینه دوبار از نظریماری‌های مندرج در بنده امور داری ارزیابی آزمایشگاهی فرار گیرند.

### ۱. درختان مادری (Mother Blocks)

به باغات گیاهانی از ارقام تجاری محصولات سردرخنی با غبانی با اصلانی معلوم و کاملاً سالم اطلاق می شود که تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بلرو نهال در مکانی با فاصله اینزو لاسیون استاندارد کاشته شده و از مواد گیاهی آنها برای تولید نهال استفاده می شود.

توضیحات:

۱. درختان مادری باید عاری از کلیه پاتوژنهای بیسینیک از جمله *F. solani* باشد.
  ۲. مواد نکثیری (پاچوش و قلمه) درختان مادری از هسته های اولیه گرفته می شود.
  ۳. باغات مادری در بیرون از گلخانه در خاک طبیعی باغ که عاری از قارچ *F. solani* بوده و به تأیید سازمان حفظ نباتات رسیده، احداث می شوند.
  ۴. تعین فاصله حریم امن (نقدان منابع آلودگی) برای باغات مادری به نوع استفاده از باغ، یماری های قابل انتقال و برد پروازی حشرات ناقل بستگی دارد. در مورد عناب، حریم امن باغات ۲۰۰ متر تعیین می شود.
  ۵. جهت اطمینان از عدم انتقال یماری های خاکری، باید آبیاری از نوع تحت فشار باشد و توسط لوله های آبیاری مستقیماً از منبع تامین آب به زمین اصلی مقل کردد.
- همه درختان مادری ضمن ارزیابی چشمی مرتب از نظر سلامت در برابر یماریهای خاکبرد و هوابرد، باید سالینه حدائق یک بار از نظر عدم آلودگی به *F. solani* مورد ارزیابی آزمایشگاهی فرار گیرند. در صورت مشاهده آلودگی ضروری است درخت (درختان) آلوده حذف و با درخت سالم جایگزین شود.

### ۲. نهال گواهی شده (Certified)

به نهالی اطلاع می شود که احتیاط، سلامت و مشخصات ظاهری آن مطابق با استانداردهای مصوب بوده و مواد اولیه آن از باغات مادری نیمه می شود.

توضیحات:

۱. مواد نکثیری باید از ارقام تجاری شناخته شده باشد.
۲. نهال گواهی شده باید عاری از قارچ *F. solani* باشد.
۳. نهالستانها باید از سایر منابع آلودگی ۱۰۰ متر فاصله داشته باشند.



جدول (۱) بیماریهای قبل انتقال عناب

عامل پیماری	انتقال	دامنه میزبانی
<i>Fusarium solani</i>	خاک آلدود، آب آلدود؛ قلمه های آلدود و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع

توضیحات:

روش های ردیابی: استفاده از مجط های کشت و در صورت نیاز استفاده از PCR

