

بسمه تعالیٰ

استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالسازی گواوا

تاریخ:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیری نهال (Basic & Pre-basic Stocks)

هسته های اولیه: مواد گیاهی محدودی از ارقام نجاری هستند که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بلرو نهال محرز شده و در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.

پیش تکثیر: مواد گیاهی برگرفته از هسته های اولیه بوده که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بلرو نهال محرز شده است. این طبقه به عنوان حلقه بین هسته های اولیه و باغات مادری قرار دارد و مواد گیاهی مورد استفاده برای احداث باغ مادری از آنها تهیه می شود. این مواد گیاهی در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.

توضیحات:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید عاری از کلبه پاتوژنهای گیاهی باشد.

۲. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید در اسکرین هارسیاهی مجزا در خاکی کاملا اسنزیل در گلدان و بدون نماس با خاک اسکرین هاوس نگهداری شوند.

۳. جهت جلاسازی گلدهای حاوی هسته های اولیه و پیش تکثیری، کف اسکرین هاوس باید حداقل ناعمق ۸۰ سانتیمتر از سکریزه پوشیده شده و گلدها بر روی سکرهای بتی با پلاسیک نگهداری شوند.

۴. به غیر از هسته دن اولیه و پیش تکثیری، گلدها باید در اسکرین هاوس موجود باشد. به شعاع ۲۰ متری اسکرین هاوس هم باید گیاهی موجود باشد.

۵. ضمن ارزیابی چشمی مرتب از نظر سلامت در برابر بیماریهای خاکبرد و هوابرد نظر *Phytophthora spp.* باید سالانه دو بار از نظر عدم آسودگی به پیماریهای سبستیک (در صورت گزارش) مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند.


۶. با توجه به انتقال تعدادی از بیروسانهای گیاهی از طرق بذر، هسته های اولیه و پیش تکثیر باید به مرحله گلدهی برسند.

۲. درختان مادری (Mother Blocks)

به باغات گیاهانی از ارقام نجاری محصولات سردرختی باغبانی با اصالتی معلوم و کاملا سالم اطلاق می شود که تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بلرو نهال در مکانی با فاصله ایزولاسیون استاندارد کاشته شده و از مواد گیاهی آنها برای تولید نهال استفاده می شود.

توضیحات:

۱. درختان مادری باید عاری از کلبه پاتوژنهای سبستیک باشند.



۱. باغات مادری در بیرون از گلخانه در خاک طبیعی باعث که عاری از نامندهای *Meloidogyne spp* و *Phytophthora spp* شود و به تابه سازمان حفظ بناهای رسیده احداث می شوند.
۲. تعین فاصله حریم امن (فندان منابع گیاهی آلوده) برای باغات مادری به نوع استفاده از باغ، بیماریهای قابل انتقال و برد پرورا زی هرات ناقلستگی دارد. ذر مورد گواوا، حریم امن باغات ۵۰۰ متر تعین می شود.
۳. جهت اطمینان از عدم انتقال بیماریهای خاکزی، باید آبیاری از نوع تحت فشار باشد و توپوت لوله های آبیاری مستقیماً از منبع تامین آب (با اولویت چاه) به زمین اصلی منتقل گردد.
۴. همه درختان مادری ضمن ارزیابی چشمی مرتب (۲-۳ بار در سال در اوخر بهار و اواسط تابستان) از نظر سلامت عمومی (عدم وجود عالم بیماری)، باید هر سال بکبار از نظر عدم آلودگی به پاتوزنهای بستگی (در صورت گزارش) مورد ارزیابی آزمایشگاهی فرار گیرند. در صورت مشاهده آلودگی ضروری است درخت (درختان) آلود حذف و بارخت سالم جایگزین شود.
۵. با توجه به انتقال تعدادی پاتوزنهای گیاهی از طریق بذر، باغات مادری بجز باغاتی که برای بذرگری مورد استفاده قرار می گیرند، باید به مرحله گلدهی برسند.

۳. نهال گواهی شده (Certified):

به نهالی اطلاقی می شود که اصولت، سلامت و مشخصات ظاهری آن مطابق با استانداردهای مصوب شود و مواد اولیه آن از باغات مادری نهیه می شود.


ترتیبچان:

۱. نهال گواهی شده باید عاری از *Phytophthora spp* و *Meloidogyne spp* باشد.

۲. نهالستانها باید از سایر منابع آلودگی ۵۰۰ متر فاصله داشته باشند.

جدول (۱) بیماریهای قابل انتقال گواوا

عامل بیماری	انتقال	دامنه میزانی
<i>Phytophthora spp</i>	خاک آلوده، آب آلوده، فلمه های آلوده و ادوات گشاورزی	دامنه میزانی بسیار وسیع
<i>Meloidogyne spp</i> <i>M. hapla</i> <i>M. arenaria</i> <i>M. incognita</i> <i>M. javanica</i>	خاک	پلی فاز



توضیحات:

ازوش های زیبایی؛ بروزی؛ ظاهری و در صورت نیاز نگاری استفاده از محیط های کنک انتخابی

ازوش های زیبایی؛ بروزی ظاهری اندام های علیین؛ طوفه و پرث

