

بسمه تعالیٰ

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

.....تاریخ:

«فرم استاندارد پیشنهادی»

عنوان استاندارد: (تدوین / بازنگری):

استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستانهای سیب



استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستانهای سیب

تعاریف:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیری نهال (Basic & Pre-basic)

هسته های اولیه: مواد گیاهی محدودی از ارقام تجاری هستند که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده و در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.

پیش تکثیر: مواد گیاهی برگرفته از هسته های اولیه بوده که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده است. این طبقه به عنوان حلقه بین هسته های اولیه و باغات مادری قرار دارد و مواد گیاهی مورد استفاده برای احداث باغ مادری از آنها تهیه می شود. این مواد گیاهی در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.

توضیحات:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید عاری از کلیه پاتوژنهای گیاهی از جمله ویروسهای *Tobacco ringspot Nepovirus*

Apple chlorotic leaf spot Trichovirus Tomato ringspot Nepovirus (ToRSV)، *(TRSV)*

Apple stem pitting Foveavirus (ASPV), *Apple Apple mosaic Ilarvirus (ApMV)*، *(ACLSV)*

آوندی و غیر آوندی از جمله آتشک دانه داران (*Erwinia amylovora*) باشد.

۲. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید در اسکرین هاوسهای مجزا در خاکی کاملا استریل در گلدان و بدون تماس با خاک اسکرین هاووس نگهداری شوند.

۳. چهت جداسازی گلدانهای حاوی هسته های اولیه و پیش تکثیری، کفت اسکرین هاووس باید حداقل تا عمق ۸۰ سانتیمتر از سنگریزه پوشیده شده و گلدانها بر روی سکوهای بتی یا پلاستیکی نگهداری شوند.

۴. به غیر از هسته های اولیه و پیش تکثیری، گیاهان دیگری نباید در اسکرین هاووس موجود باشند. به شعاع ۲۰ متری اسکرین هاووس هم نباید گیاهی موجود باشد.

۵. ضمن ارزیابی چشمی مرتب از نظر سلامت در برابر بیماریهای خاکبرد و هوابرد نظیر *Rosellinia necatrix*, *Rhizobium radiobacter*, *Phytophthora spp.*, *Armillaria mellea* به بیماری ذکر شده در بند ۱ مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند.

۶. با توجه به انتقال تعدادی از ویروسهای گیاهی از طریق بذر، هسته های اولیه و پیش تکثیری نباید به مرحله گلدهی برسند.



۲. درختان مادری (Mother Blocks)

به باگات گیاهانی از ارقام تجاری محصولات سردرختی باگانی با اصلانی معلوم و کاملاً سالم اطلاق می شود که تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در مکانی با فاصله ایزوولاسیون استاندارد کاشته شده و از مواد گیاهی آنها برای تولید نهال استفاده می شود. توضیحات:

۱. درختان مادری باید عاری از ویروسهای ASGV ، ASPV ، ApMV ، ACLSV ، ToRSV ، TRSV ، فایتوپلاسماهای (از Apple proliferation) و باکتریهای سخت رشد و آوندی از جمله آتشک دانه داران (*E. amylovora*) باشد.
۲. پایه و پیوندک درختان مادری از مواد پیش تکثیر تهیه می شود.
۳. باگات مادری در بیرون از گلخانه در خاک طبیعی باغ که عاری از نباتدهای *Longidorous spp.*, *Xiphinema spp.*, *Armillaria Rosellinia necatrix* و قارچهای *Pratylenchus vulnus*, *P. penetrans*, *Meloidogyne spp.*, *Rhizobium radiobacter* و *Phytophthora spp.* بوده و به تأیید سازمان حفظ نباتات رسیده، احداث می شوند.
۴. تعیین فاصله حریم امن (فقدان منابع گیاهی آلوده) برای باگات مادری به نوع استفاده از باغ، یماریهای قابل انتقال و برد پروازی حشرات ناقل بستگی دارد. در مورد سیب، حریم امن باگات ۱۰۰۰ متر تعیین می شود.
۵. جهت اطمینان از عدم انتقال یماریهای خاکزی، باید آیاری از نوع تحت فشار باشد و توسط لوله های آیاری مستقیماً از منبع تامین آب به زمین اصلی متصل گردد.
۶. همه درختان مادری ضمن ارزیابی چشمی مرتب (۲-۳ بار در سال در اوایل بهار و اواسط تابستان) از نظر سلامت عمومی (عدم وجود علائم یماری)، باید سالیانه حداقل یک بار از نظر عدم آلودگی به *ToRSV* و *ACLSV* و *ApMV* و *ToRSV* و هر پنج سال یکبار از نظر عدم آلودگی به بقیه پاتوژنهای ذکر شده در بند ۱ مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند. در صورت مشاهده آلودگی (پاستناء آلودگی به *E. amylovora*) ضروری است درخت (درختان) آلوده حذف و با درخت سالم جایگزین شود. با توجه به اینکه باکتری *E. amylovora* به طور آندوفیت ممکن است وجود داشته باشد، بررسی آزمایشگاهی این یماری یشنود نمی شود، فقط در صورت بروز علائم ضمن استفاده از سوم خد باکتری، از درخت آلوده پیوندک تهیه نشود.
۷. با توجه به انتقال تعدادی از ویروسهای گیاهی از طریق بذر، باگات مادری بجز باگاتی که برای بذرگیری مورد استفاده قرار می گیرند، باید به مرحله گلدهی برسند.

۳. نهال گواهی شده (Certified)

نهال به نهالی اطلاق می شود که اصالت، سلامت و مشخصات ظاهری آن مطابق با استانداردهای مصوب بوده و مواد اولیه آن از باگات مادری تهیه می شود.


توضیحات:

۱. پایه و پیوندک باید متجانس و از ارقام تجاری شناخته شده بوده و عمل پیوند در زمان مناسب انجام شده باشد.
۲. نهال گواهی شده باید عاری از ویروسهای *Phytoplasma* (Apple, *ACLSV*, *ApMV* و *ToRSV*، باکتریهای *Phytophthora spp.*, *R. necatrix*, *A. mellea* (proliferation), *R. radiobacter*, *E. amylovora* و *Xiphinema spp.*, *Meloidogyne hapla*, *M. arenaria*, *Longidorus spp.*, *Pratylenchus vulnus*, *M. javanica* و *M. incognita* *P. penetrans* نباتدهای باشد.
۳. نهالستانها باید از مایع منابع آلودگی ۱۰۰۰ متر فاصله داشته باشند.



جدول ۱) بیماریهای قبل انتقال سبب

عامل بیماری	انتقال	دامنه میزبانی
<i>Tobacco ringspot 'nepovirus'</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد (Xiphinema spp.)، خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر (٪۳-۱۰۰)	بیش از ۱۷ خانواده گیاهی تک لپه ای و دولپه ای (شامل هسته داران، سبب، انگور، پاپایا، سویا، لوپین، توتون، نعناع، شفابیق، زنبق، گلابیول، شمعدانی، زبان گنجشک، Elderberry (sambucus spp.), Blueberry، American dogwood (Cornus florida)، Phaseolus spp.، Blackberry (Rubus fruticosus)، Chenopodium، Capsicum spp.، Petunia sp.، Vigna spp. spp.
<i>Apple chlorotic leaf 'spot trichovirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و هسته داران، خانواده های Chenopodiaceae و Leguminosaceae
<i>'Apple mosaic ilarvirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و هسته داران، خانواده های رزاسه و کوکوریتاسه
<i>Tomato ring spot virus'</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد (Xiphinema spp.)، خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر	بیش از ۳۵ خانواده گیاهی متعلق به تک لپه ایها و دولپه ایها (شامل هسته داران، کوکوریتاسه، گیاهان زیستی، انگور، توتون، توت فرنگی، Chenopodium، Phaseolus spp.، Blackberry، Raspberry، Petunia spp.، Vigna spp. spp.)
<i>Apple stem pitting Foveavirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و خانواده های Amaranthaceae، Chenopodiaceae، Cucurbitaceae، Pedaliaceae، Rosaceae، Solanaceae، Tetragoniaceae
<i>Apple stem grooving capillovirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و خانواده های Aizoaceae، Amaranthaceae، Chenopodiaceae، Cucurbitaceae، Labitaceae، Leguminosae، Rosaceae، Scrophulariaceae، Solanaceae
<i>Phytophthora spp.'</i>	خاک آلوده، آب آلوده، قلمه های آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع
<i>Armillaria mellea</i>	پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه، آب آلوده، نهال های آلوده، قطعات گیاهی آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع
<i>Rosellinia necatrix</i>	پوسیدگی رزلینیایی ریشه، خاک و آب آلوده، نهال های آلوده، مواد گیاهی آلوده و ادوات کشاورزی	بسیار وسیع (۱۷۰ گونه گیاهی در ۶۳ جنس و ۳۰ خانواده)
<i>Meloidogyne spp^۵</i> <i>M. hapla</i> <i>M. arenaria</i> <i>M. incognita</i> <i>M. javanica</i>	خاک	پلی فاز



^۱ <i>Longidorus</i> spp.	خاک	پلی فاز
<i>Pratylenchus vulnus</i> ^۲ <i>P. penetrans</i>	خاک	پلی فاز
^۳ <i>Xiphinema</i> spp	خاک	پلی فاز
<i>Phytoplasma</i> (Apple ^۴ proliferation)	مواد گیاهی آلوده، زنجر کها	دانه داران
^۵ <i>Erwinia amylovora</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران (میب، گلابی، از گیل، به، رز)
^۶ <i>Rhizobium radiobacter</i>	خاک، مواد گیاهی آلوده	بسیار وسیع

توضیحات:^۱ روش های ردیابی: الایزا و روش های بیولوژیک و در صورت پذیرش روش های مولکولی

^۲ روش های ردیابی: بررسی ظاهری و در صورت نیاز تنه کناری و استفاده از محیط های کشت اختصاصی

^۳ روش های ردیابی: بررسی ظاهری لندام های هوایی، طوفه و ریشه

^۴ روش های ردیابی: استفاده از PCR با برایمرهای یونیورسال

^۵ روش های ردیابی: استفاده از PCR و کشت روی محیط اختصاصی و روش های بیوشیمیایی

