

استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستان های زرشک

تعاریف:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیری نهال (Basic & Pre-basic Stocks)

هسته های اولیه: مواد گیاهی محدودی از ارقام تجاری هستند که اصالت و سلامت آنها توسط مورسه تحقیقات ثبت و گواهی پدر و نهال محرز شده و در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.

پیش تکثیر: مواد گیاهی برگرفته از هسته های اولیه بوده که اصالت و سلامت آنها توسط مورسه تحقیقات ثبت و گواهی پدر و نهال محرز شده است. این طبقه به عنوان طبقه بین هسته های اولیه و باغات مادری قرار دارد و مواد گیاهی مورد استفاده برای احداث باغ مادری از آنها تهیه می شود. این مواد گیاهی در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری میشوند.

توضیحات:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید عاری از کلیه پاتوزن های گیاهی سیستمیک از جمله *Verticillium spp.* باشند.
۲. هسته های اولیه و پیش تکثیری باید در خاکي کاملاً استریل در گلدان و بدون تماس با خاک اسکرین هاوس نگهداری شوند.
۳. جهت جداسازی گلدانهای حاوی هسته های اولیه و پیش تکثیری، کف اسکرین هاوس باید حداقل تا عمق ۸۰ سانتیمتر از سنگریزه پوشیده شده و گلدانها بر روی سکوهای پستی یا پلاستیکی نگهداری شوند.
۴. به غیر از هسته های اولیه و پیش تکثیری، گیاهان دیگری نباید در اسکرین هاوس موجود باشند. به شعاع ۲۰ متری اسکرین هاوس هم نباید گیاهی موجود باشد.
۵. هسته های اولیه و پیش تکثیری باید ضمن ارزیابی مرتب چشمی از نظر بیماریهای هوا برد و خاک برد، باید سالانه دو بار از نظر بیماری های مندرج در بند امورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند.



۳. درختان مادری (Mother Blocks):

به باغات گیاهانی از ارقام تجاری محصولات سردرختی باغبانی با اصلتی معلوم و کاملاً سالم اطلاق می شود که تحت نظارت مورسه تحقیقات ثبت و گواهی پدر و نهال در مکتبی با فاصله ایزولاسیون استاندارد کاشته شده و از مواد گیاهی آنها برای تولید نهال استفاده می شود.

توضیحات:

۱. درختان مادری باید عاری از کلیه پاتوزنهای سیستمیک از جمله *Verticillium* spp. باشند.

۲. مواد تکثیری (پاجوش و قلمه) درختان مادری از هسته های اولیه گرفته می شود.

۳. باغات مادری در بیرون از گلخانه در خاک طبیعی باغ که عاری از قارچ *Verticillium* spp. بوده و به تأیید سازمان حفظ نباتات رسیده، احداث می شوند.

۴. تعیین فاصله حریم امن (فقدان منابع آلودگی) برای باغات مادری به نوع استفاده از باغ، بیماری های قابل انتقال و برد پرواز حشرات ناقل بستگی دارد. در مورد عناب، حریم امن باغات ۲۰۰ متر تعیین می شود.

۵. جهت اطمینان از عدم انتقال بیماری های خاکری، باید آبیاری از نوع تحت فشار باشد و توسط لوله های آبیاری مستقیماً از منبع تأمین آب به زمین اصلی منتقل گردد.

۶. همه درختان مادری ضمن ارزیابی چشمی مرتب از نظر سلامت در برابر بیماریهای خاکبرد و موآورد، باید سالانه حداقل یکبار از نظر عدم آلودگی به همه *Verticillium* spp. مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند. در صورت مشاهده آلودگی ضروری است درخت (درختان) آلوده حذف و با درخت سالم جایگزین شود.

۳. نهال گواهی شده (Certified):

به نهالی اطلاق می شود که اصالت، سلامت و مشخصات ظاهری آن مطابق با استانداردهای مصوب بوده و مواد اولیه آن از باغات مادری تهیه می شود. توضیحات:

۱. مواد تکثیری باید از ارقام تجاری شناخته شده باشد.

۲. نهال گواهی شده باید عاری از قارچ *Verticillium* spp. باشد.

