

استاندارد مزرعه هویج

| طبقه بذری | | | عوامل | | |
|------------|-------|-----------|--|--|-------------------------------|
| گواهی ش.ه. | مادری | سوپر الیت | | | |
| ۱ | ۲ | ۲ | تناوب (حداقل سال) | | |
| ۵ | ۵ | ۵ | بذر-ریشه | فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر) | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ریشه بذر | | |
| ۲/۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | سایر ارقام (حداکثر بوته) درصد | | |
| ۵ | * | * | درصد تعداد بذر علفهای هرز در تعداد بذر گیاه | علف های هرز | |
| ۱ | ۰/۵ | ۰/۱ | Xanthomonas campestris pv. carotae | پریوکاریوت ها | بیماریهای بذرزاد (درصد) |
| | | | Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola | | |
| ۱ | ۰/۵ | ۰/۵ | Alternaria sp. | قارچ ها | |
| - | - | - | Ditylenchus dipsasi | نماتد | |

توضیحات: حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.

* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.

** در صورت وجود شته فوق و بیماری ویروسی، طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات انجام گیرد.



استاندارد بذر هویج

| طبقه بذری | | | عوامل | |
|------------|-------|-----------|---|-------------------------|
| گواهی بنده | مادری | سوپر الیت | | |
| ۹۷ | ۹۸ | ۹۹ | خلوص فیزیکی (حداقل در صد) | |
| ۳ | ۲ | ۱ | مواد جامد (حداکثر در صد) | |
| ٪۰/۱ | ٪۰/۰۵ | ۰ | بذر سایر محصولات (درصد) | |
| ٪۰/۱۲ | ٪۰/۱ | ۰ | حداکثر بذر سایر ارقام | |
| ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | حداقل قوه نامیه (درصد) | |
| ۸ | ۸ | ۸ | حداکثر رطوبت بذر (درصد) | |
| ۰/۱ | ۰ | ۰ | درصد تعداد بذر علفهای هرز در تعداد بذر گیاه | علف های هرز |
| - | - | - | <i>Cavariella aegopodii</i> | آفات |
| - | - | - | Carrot red leaf virus | ویروس ها |
| ۰/۵ | ۰/۱ | ۰/۰۵ | Xanthomonas campestris pv. carotae | بیماریهای بذرزاد (درصد) |
| - | - | - | Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola | |
| - | - | - | Alternaria sp. | |
| - | - | - | Ditylenchus dipsasi | نماتد |

