

استاندارد مزرعه کاهو

طبقه بذری			عوامل	
گواهی شده	مادری	سویر البت		
۱	۱	۱	تناوب (حداقل سال)	
۵۰۰	۸۰۰	۱۵۰۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)	
۲/۱۰۰۰۰	۲/۱۰۰۰	۱/۱۰۰۰	سایر ارقام (حداکثر بوته)	
*	*	*	تعداد بذرعلف های هرز (در هزار عدد بذر گیاه)	
**	**	**	Aphis gossypii Macrosiphum euphorbiae M.gei , Myzus persicae	آفات
۱	۰/۵	۰	Lettuce mosaic virus Tobacco ring spot virus	ویروس ها بیماریهای بذرزاد (درصد)
۱	۰/۵	۰/۱	Verticillium albo-atrum Alternaria sp.	قارچ ها

توضیحات:

* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.
 ** در صورت وجود بیماریهای ویروسی در منطقه در تمامی کلاسها ضدعفونی بذر با حشره کش های توصیه شده سه زمان حفظ نباتات ضروری است.



استاندارد بذر کاهو

طبقه بذری			عوامل		
گواهی داده	مادری	سوپر الیت			
۹۸	۹۸	۹۹	خلوص فیزیکی (حداقل در صد)		
۲	۲	۱	مواد جامد (حداکثر در صد)		
۰	۰	۰	بذر سایر محصولات (در صد)		
۰/۵	۰	۰	حداکثر بذر سایر ارقام		
۷۰	۷۰	۷۰	حداقل قوه نامیه (درصد)		
۶	۶	۶	حداکثر رطوبت بذر (درصد)		
۰/۵	۰	*	علف های هرز (در هزار عدد بذر گیاه)		
	-	-	Lettuce mosaic virus Tobacco ring spot virus	ویروس ها	بیماریهای بذرزاد (درصد)
۱	۰/۵	۰/۱	Verticillium albo-atrum Alternaria spp	قارچ ها	

توضیحات: حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.

