

استاندارد مزرعه نخود فرنگی

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شده	مادری	سوپر الیت			
۲	۲	۲	تناوب (حداقل سال)		
۲۰	۲۰	۲۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)		
۰/۵ درصد	۰/۱ درصد	۰/۱ درصد	سایر ارقام (حداکثر بوته)		
-	-	-	علف‌های هرز (حداکثر تعداد بوته در متر مربع)		
-	-	-	آفات		
-	-	-	Pea early browning virus Pea-seed born mosaic virus	ویروس‌ها	بیماری‌های بذر زاد
۱	۰/۳	۰/۱	Ascochyta spp. Colletotrichum pisi	قارچ‌ها	
۰/۵	۰/۱	۰/۵	Ditylenchus dipsasi	نمات‌ها	

توضیحات:

- حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.



استاندارد بذر نخود فرنگی

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شده	مادری	سوپر الیت			
۹۸	۹۸	۹۸	خلوص فیزیکی (حداقل در صد)		
٪۲	٪۲	٪۲	مواد جامد (حداکثر در صد)		
۲ عدد و یک کیلو گرم	۰	۰	بذر سایر محصولات (درصد)		
۰	۰	۰	حداکثر تعداد بذر علف‌های هرز غیر مجاز در یک کیلوگرم		
۷۵	۷۵	۷۵	حداقل قوه نامیه (درصد)		
۹	۹	۹	حداکثر رطوبت بذر (درصد)		
۱	۰	۰	Pea early browning virus Pea-seed mosaic virus	ویروس‌ها	بیماریهای بذر زاد (درصد)
۱	۰/۵	۰/۱	Ascochyta spp. Colletotrichum pisi	قارچ‌ها	
-	-	-	Ditylenchus dipsasi	نماتدها	

توضیحات:

- قوه نامیه با احتساب بذر سخت hard seed می باشد.

