

استاندارد مزرعه شلغم

طبقه بندی			عوامل	
گواهی شده	مادری	سوبر الیت		
۲	۲	۴	تناوب (حداقل سال)	
۵	۵	۵	ریشه	فاصله مزرعه از سایر مزارع
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	بذر	(حداقل متر)
۲/۱۰۰۰	۱/۱۰۰۰	۱/۲۰۰۰	سایر ارقام (حداکثر بوته) درصد	
۰	۰	۰	علف های هرز	
۰-۰	۰-۰	۰-۰	آفات MYZUS PERSICAE & Brevicoryne brassicae	
-۰/۵	-۰/۱	-	Turnip mosaic virus Turnip yellow mosaic virus	ویروس ها
۱	-۰/۵	-۰/۱	Xanthomonas campestris pv.campestris	پروگاریوت ها
۱	-۰/۵	-۰/۱	Fusarium oxysporum Alternaria brassica	قارچ ها
-۰/۵	-۰/۱	-۰/۱		نمایند

توضیحات: حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.

* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.
تعداد بذر علفهای هرز هم خانواده از ۵ عدد بیشتر نباشد.

** در صورت وجود بیماریهای ویروسی در منطقه در کلاسهای سوبر الیت و مادری ضدعفوی بذر با حشره کش توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات ضروری و در کلاس گواهی شده اختیاری است.



استاندارد بذر شلغم

طبقه بذری			عوامل		
تواهی اندوه	ساده	سوبر الایت			
۹۸	۹۸	۹۸	خلوص فیزیکی(حداقل در صد)		
٪۲	٪۲	٪۲	مواد جامد(حداکثر در صد)		
٪۱	٪۱	٪۰۵	بذر سایر محصولات(در صد)		
٪۲۵	٪۱	٪۰۰۵	حداکثر بذر سایر ارقام		
٪۰	٪۰	٪۰	حداقل قوه نامیه(در صد)		
٪	٪	٪	حداکثر رطوبت بذر(در صد)		
٪۰	٪۰	٪	علف های هرز		
	-	-	Turnip mosaic virus Turnip yellow mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذر زاد (در صد)
٪۰	٪۱	٪۰۰۵	Xanthomonas campestris pv.campestris	پروکاریوت ها	
٪۰	٪۱	٪۱	Fusarium oxysporum Alternaria brassica	قارچ ها	

