

## استاندارد مزرعه تربچه

طبقه بندی			عوامل				
گواهی شده	مادری	سوپر الیت					
۲	۲	۴	تناوب (حداقل سال)				
۵	۵	۵	برای تولید ریشه (غده)	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر) بذر			
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	برای تولید بذر				
۱/۵۰۰	۳/۱۰۰۰	۱/۲۰۰۰	سایر اوقام (حداکثر بوده)				
*	*	*	علف های هرز				
آفات							
***	**	**	Myzus persicae Brevicoryne brassicae				
۰/۵	۰/۱	*	Culiflower mosaic virus Turnip mosaic virus	*** ویروس ها	بیماریهای بذر زاد (درصد)		
۵	۱	۰/۵	Rhizoctonia solani	قارچ ها			
۰/۵	۰/۱	۰/۱	Heterodera Schachtii	نماتد			

توضیحات: حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.

\* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات و گیاهی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.

\*\* در صورت وجود بیماریهای ویروسی در منطقه در کلاسهای سوپر الیت و مادری، ضدغذونی بذر بایستی طبق توصیه «ازمان

حفظ نباتات صورت می گیرد.

همته اولیه بایستی دارای مشخصه های ثبت شده باشد

کاربرد علف کش بسیار نادر است و گیاهان دائمی مشکل ساز هستند و سایر گیاهان یکساله در وجین حذف می شوند.



## استاندارد بذر تربچه

طبقه بذری			عوامل		
گواه شده	مادری	سویر الیت			
۹۸	۹۸	۹۸	* خلوص فیزیکی (حداقل در صد)		
۴	۲	۲	مواد چامد (حداکثر در صد)		
+/-	+/-	+/-	بذر سایر محصولات (در صد)		
۳۰ دانه در کیلوگرم	۱۰ دانه در کیلوگرم	*	حداکثر بذر سایر علفهای هرز		
۰/۴۵	۰/۱	۰/۰۵	حداکثر بذر سایر ارقام		
۸*	۸*	۸*	* حداقل قوه نامیه (در صد)		
A	A	A	حداکثر رطوبت بذر (در صد)		
-	-	-	Culiflower mosaic virus Turnip mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذر زاد (در صد)
-	-	-	Rhizoctonia solani	قارچ ها	

\* در خصوص بذرهای دانه ای و هیبرید استاندارد خلوص فیزیکی ۱۰۰٪ و قوه نامیه ۹۵٪

