

استاندارد مزرعه ذرت شییرین

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شاه	مادری	سوپر الیت			
۲	۲	۲	تناوب (حداقل سال) ***		
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)		
۱/۱۰۰۰	۰	۰	سایر ارقام (حداکثر بوته)		
*	*	*	علف های هرز		
**	**	**	آفات مکنده (شته ها و زنجبرک ها)		
۰	۰	۰	Maize mosaic virus Wheat streak mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذرزاد (درصد)
۱	۰/۵	۰/۱	Ervinia stewartii	پروکاریوت ها	
۲ درصد	۰/۱	۰/۵	Ustilago zeae	قارچ ها	

توضیحات: حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.

* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.

** در مناطق آلوده به بیماریهای ویروسی ضدعفونی بذر با حشره کشهای (نیکوتینوئید) ضرورت دارد. در صورت بالا بودن

شدت آلودگی و آفات در مزرعه، بایستی طبق نظر و توصیه بازرس مزرعه عمل شود.

*** در سال قبل غلات گندم و جو و چغندر قند کشت نشده باشد.



استاندارد بذر ذرت شیرین

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شده	مادری	سوپر ایت			
%۹۸			خلوص فیزیکی (حداقل در صد)		
%۲			مواد جامد (حداکثر در صد)		
			بذر سایر محصولات		
۵/۹۰۰			حداکثر بذر سایر ارقام		
%۸۰			حداقل قوه نامیه (درصد) بعلاوه بذور سخت		
%۸			حداکثر رطوبت بذر (درصد)		
۰	۰	۰	علف های هرز		
-	-	-	Maize mosaic virus Wheat streak mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذر زاد (درصد)
۰/۵	۰/۱	۰/۰۵	Ervinia chrysantemi f.sp. zeae Ervinia stewartii	پروکاریوت ها	
۰/۵	۰/۱	۰/۰۵	Fusarium spp. Ustilago zeae	قارچ ها	

