



بسمه تعالیٰ

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

.....تاریخ:

### «فرم استاندارد پیشنهادی»

عنوان استاندارد: (تدوین / بازنگری):

استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستانهای سیب



بسمه تعالی

## استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستانهای سیب

### تعاریف:

#### ۱. هسته های اولیه و پیش تکثیری نهال (Basic & Pre-basic):

هسته های اولیه: مواد گیاهی محدودی از ارقام تجاری هستند که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده و در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.

پیش تکثیر: مواد گیاهی برگرفته از هسته های اولیه بوده که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده است. این طبقه به عنوان حلقه بین هسته های اولیه و باغات مادری قرار دارد و مواد گیاهی مورد استفاده برای احداث باغ مادری از آنها تهیه می شود. این مواد گیاهی در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری میشوند.

### توضیحات:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید عاری از کلیه پاتوژنهای گیاهی از جمله ویروسهای

*Apple chlorotic leaf spot Trichovirus Tomato ringspot Nepovirus (ToRSV)* (ToRSV)

*Apple stem pitting Foveavirus (ASPV), Apple Apple mosaic Ilarvirus (ApMV)* (ACLSV)

*فایتوپلاسماهای (از جمله stem grooving Capillovirus (ASGV)،* باکتریهای سخت رشد

آوندی و غیر آوندی از جمله آتشک دانه داران (*Erwinia amylovora*) باشند.

۲. هسته های اولیه و پیش تکثیری باید در اسکرین هاوسهای مجزا در خاکی کاملا استریل در گلدان و بدون تماس با خاک اسکرین هاوس نگهداری شوند.

۳. جهت جداسازی گلدانهای حاوی هسته های اولیه و پیش تکثیری، کف اسکرین هاوس باید حداقل تا عمق ۸۰ سانتیمتر از سنتگریزه پوشیده شده و گلدانها بر روی سکوهای بتنی یا پلاستیکی نگهداری شوند.

۴. به غیر از هسته های اولیه و پیش تکثیری، گیاهان دیگری نباید در اسکرین هاوس موجود باشند. به شعاع ۲۰ متری اسکرین هاوس هم نباید گیاهی موجود باشد.

۵. ضمن ارزیابی چشمی مرتب از نظر سلامت در برابر بیماریهای خاکبرد و هوابرد نظیر *Rosellinia necatrix*,

*Rhizobium radiobacter*, *Phytophthora spp*, *Armillaria mellea*

به بیماری ذکر شده در بند ۱ مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند.

۶. با توجه به انتقال تعدادی از ویروسهای گیاهی از طریق بذر، هسته های اولیه و پیش تکثیری نباید به مرحله گلدهی برسند.



## ۲. درختان مادری (Mother Blocks)

به باغات گیاهانی از ارقام تجاری محصولات سردرختی با غلبه بر اصلاحی معلوم و کاملاً سالم اطلاق می‌شود که تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در مکانی با فاصله ایزوپلاسیون استاندارد کاشته شده و از مواد گیاهی آنها برای تولید نهال استفاده می‌شود. توضیحات:

۱. درختان مادری باید عاری از ویروسهای *ToRSV*, *APMV*, *ASPV*, *ACLSV*, *ASGV*, *Faibotoplasmah* (از *E. amylovora*) باکتریهای سخت رشد و آوندی از جمله آتشک دانه داران (*Xiphinema*) باشند.
۲. پایه و پیوندک درختان مادری از مواد پیش تکثیر تهیه می‌شود.
۳. باغات مادری در بیرون از گلخانه در خاک طبیعی باغ که عاری از نماتدهای *Pratylenchus vulnus*, *P. penetrans*, *Meloidogyne spp.*, *Longidorus spp.*, *Armillaria Rosellinia necatrix* و قارچهای *Rhizobium radiobacter* و *Phytophthora spp.* بوده و به تایید سازمان حفظ نباتات رسیده، احداث می‌شوند.
۴. تعیین فاصله حریم امن (قدمان منابع گیاهی آلدود) برای باغات مادری به نوع استفاده از باغ، بیماریهای قابل انتقال و برد پروازی حشرات ناقل بستگی دارد. در مورد سیب، حریم امن باغات ۱۰۰۰ متر تعیین می‌شود.
۵. جهت اطمینان از عدم انتقال بیماریهای خاکزی، باید آبیاری از نوع تحت فشار باشد و توسط لوله های آبیاری مستقیماً از منبع تامین آب به زمین اصلی منتقل گردد.
۶. همه درختان مادری ضمن ارزیابی چشمی (عدم وجود علائم بیماری)، باید سالیانه حداقل یک بار از نظر علم آلدودگی به *ACLSV*, *ToRSV*, *APMV* و هر پنج سال یکبار از نظر عدم آلدودگی به بقیه پاتوژنهای ذکر شده در بند ۱ مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند. در صورت مشاهده آلدودگی (باستثناء آلدودگی به *E. amylovora*) ضروری است درخت (درختان) آلدود حذف و با درخت سالم جایگزین شود. با توجه به اینکه باکتری *E. amylovora* به طور آندوفیت ممکن است وجود داشته باشد، بررسی آزمایشگاهی این بیماری بشهاد نمی‌شود، فقط در صورت بروز علائم ضمن استفاده از سوم ضد باکتری، از درخت آلدود پیوندک تهیه نشود.
۷. با توجه به انتقال تعدادی از ویروسهای گیاهی از طریق بذر، باغات مادری بجز باگاتی که برای بذرگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند، نباید به مرحله گلدهی برسند.

## ۳. نهال گواهی شده (Certified)

نهال به نهالی اطلاق می‌شود که اصالت، سلامت و مشخصات ظاهری آن مطابق با استانداردهای مصوب بوده و مواد اولیه آن از باغات مادری تهیه می‌شود.

توضیحات:

۱. پایه و پیوندک باید متجانس و از ارقام تجاری شناخته شده بوده و عمل پیوند در زمان مناسب انجام شده باشد.
۲. نهال گواهی شده باید عاری از ویروسهای *Apple*, *ACLSV*, *ToRSV*, *APMV*، باکتریهای *Phytoplasma* (Apple, *Pratylenchus*, *R. necatrix*, *A. mellea*, *P. penetrans*), *Phytophthora spp.*, *E. amylovora* و *Xiphinema spp.*, *Meloidogyne hapla*, *M. arenaria*, *Longidorus spp.*, *Pratylenchus vulnus*, *M. javanica* و *M. incognita* باشد.
۳. نهالستانها باید از سایر منابع آلدودگی ۱۰۰۰ متر فاصله داشته باشند.



جدول ۱) بیماریهای قابل انتقال سیب

عامل بیماری	انتقال	دامنه میزانی
<i>Tobacco ringspot 'nepovirus</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد (Xiphinema spp.) خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر (٪۳-۱۰۰)	بیش از ۱۷ خانواده گیاهی تک لپه ای و دولپه ای (شامل هسته داران، سیب، انگور، پاپایا، سویا، لوین، توتون، نعناع، شقایق، زنبق، گلابیول، شمعدانی، زبان گچشک، Elderberry (sambucus spp.))، Blueberry، American dogwood (Cornus florida)، Phaseolus spp.، Blackberry (Rubus fruticosus)، Chenopodium، Capsicum spp.، Petunia sp.، Vigna spp.
<i>Apple chlorotic leaf spot trichovirus</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و هسته داران، خانواده های Chenopodiaceae و Leguminosaceae
<i>'Apple mosaic ilarvirus</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و هسته داران، خانواده های رزاسه و کوکوربیتاسه
<i>Tomato ring spot virus'</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد (Xiphinema spp.) خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر	بیش از ۲۵ خانواده گیاهی متعلق به تک لپه ایها و دولپه ایها (شامل هسته داران، کوکوربیتاسه، گیاهان زیستی، انگور، توتون، توت فرنگی، Chenopodium، Phaseolus spp.، Blackberry، Raspberry، Petunia spp.، Vigna spp.، spp.)
<i>Apple stem pitting Foveavirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و خانواده های Amaranthacea، Chenopodiaceae، Cucurbitaceae، Pedaliaceae، Rosaceae، Solanaceae، Tropaeolaceae
<i>Apple stem grooving capillovirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و خانواده های Aizoaceae، Amaranthacea، Chenopodiaceae، Cucurbitaceae، Labitaceae، Leguminosae، Rosaceae، Scrophulariaceae، Solanaceae
<i>Phytophthora spp.'</i>	خاک آلوده، آب آلوده، قلمه های آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزانی بسیار وسیع
<i>Armillaria mellea</i> <sup>۳</sup>	پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه	دانه میزانی بسیار وسیع
<i>Rosellinia necatrix</i> <sup>۴</sup>	پوسیدگی رزلینیایی ریشه	بسیار وسیع (۱۷۰ گونه گیاهی در ۶۳ جنس و ۳۰ خانواده)
<i>Meloidogyne spp.<sup>۵</sup></i> <i>M. hapla</i> <i>M. arenaria</i> <i>M. incognita</i> <i>M. javanica</i>	خاک	پلی فاز



<sup>۷</sup> <i>Longidorous</i> spp.	خاک	پلی فاژ
<sup>۸</sup> <i>Pratylenchus vulnus</i> <sup>۹</sup> <i>P. penetrans</i>	خاک	پلی فاژ
<sup>۱۰</sup> <i>Xiphinema</i> spp	خاک	پلی فاژ
<sup>۱۱</sup> <i>Phytoplasma</i> (Apple "proliferation)	مواد گیاهی آلوده، زنجر کهای	دانه داران
<sup>۱۲</sup> <i>Erwinia amylovora</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران (سیب، گلابی، از گیل، به، رز)
<sup>۱۳</sup> <i>Rhizobium radiobacter</i>	خاک، مواد گیاهی آلوده	بسیار وسیع

توضیحات:  
<sup>۱</sup> روش های ردیابی: الایزا و روش های بیولوژیک و در صورت نیاز روش های مولکولی  
<sup>۷</sup> روش های ردیابی: بررسی ظاهری و در صورت نیاز تله گذاری و استفاده از محیط های کشت اختصاصی  
<sup>۸</sup> روش های ردیابی: بررسی ظاهری اندام های هوایی، طوفه و ریشه  
<sup>۹</sup> روش های ردیابی: استفاده از PCR با پرایمرهای پونیورسال  
<sup>۱۰</sup> روش های ردیابی: استفاده از PCR و کشت روی محیط اختصاصی و روش های بیوشیمیایی

