



بسمه تعالیٰ

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

.....تاریخ:

«فرم استاندارد پیشنهادی»

عنوان استاندارد: (تدوین / بازنگری):

استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستانهای هلو و شلیل



استانداردهای سلامت هسته های اولیه، باغات مادری و نهالستان های هل و شلیل

تعاریف:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیری نهال (Basic & Pre-basic):

نهال های اولیه: مواد گیاهی محدودی از ارقام تجاری هستند که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده و در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری می شوند.
پیش تکثیر: مواد گیاهی برگرفته از هسته های اولیه بوده که اصالت و سلامت آنها توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال محرز شده است. این طبقه به عنوان حلقه بین هسته های اولیه و باغات مادری قرار دارد و مواد گیاهی مورد استفاده برای احداث باغ مادری از آنها تهیه می شود. این مواد گیاهی در مکانی محافظت شده و غیر قابل نفوذ به حشرات نگهداری میشوند.

توضیحات:

۱. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید عاری از کلیه پاتوژن های گیاهی بویژه ویروس های

Tobacco *Plum* *pox* *Potyvirus*(PPV) *Prunus* *necrotic ringspot* *Ilarvirus* (PNRSV),(PDV)

Apple *chlorotic leaf spot* *Tomato* *ringspot* *Nepovirus* (ToRSV) *ringspot* *Nepovirus*(TRSV)

و *Arabis mosaic* *Nepovirus* (ArMV) *Apple mosaic* *Ilarvirus* (ApMV) *Trichovirus* (ACLSV)

فایتوپلاسمها از جمله Almond witche's broom باشند.

۲. هسته های اولیه و پیش تکثیر باید در اسکرین هاوس های مجزا در خاکی کاملا استریل در گلدان و بدون تماس با خاک اسکرین هاوس نگهداری شوند.

۳. جهت جداسازی گلدانهای حاوی هسته های اولیه و پیش تکثیری، کف اسکرین هاوس باید حداقل تا عمق ۸۰ سانتیمتر از سنگریزه پوشیده شده و گلدانها بر روی سکوهای بتنی یا پلاستیکی نگهداری شوند.

۴. به غیر از هسته های اولیه و پیش تکثیری، گیاهان دیگری نباید در اسکرین هاوس موجود باشند. به شعاع ۲۰ متری اسکرین هاوس هم نباید گیاهی موجود باشد.

۵. ضمن ارزیابی چشمی مرتب از نظر سلامت در برابر پاتوژن ها و بیماری های خاکبرد و هوابرد نظیر *Rosellinia necatrix*, *Phytophthora* spp., *Armillaria mellea*, *Verticillium dahliae* عدم آسودگی به بیماری ذکر شده در بند ۱ مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند.

۶. با توجه به انتقال تعدادی از ویروس های گیاهی از طریق بذر، هسته های اولیه و پیش تکثیری نباید به مرحله گلدهی برسند.



۲. درختان مادری (Mother blocks):

به باغات گیاهانی از ارقام تجاری محصولات سردرختی با غبانی با اصالی معلوم و کاملاً سالم اطلاق می شود که تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در مکانی با فاصله ایزو لاسیون استاندارد کاشته شده و از مواد گیاهی آنها برای تولید نهال استفاده می شود.

توضیحات:

۱. درختان مادری باید عاری از ویروس های ArMV, ApMV, ACLSV, ToRSV, TRSV, PPV, PNRSV, PDV و قارچ *V. dahliae* Almond witch's broom باشند.
۲. پایه و پیوند ک درختان مادری از مواد پیش تکثیر تهیه می شود.
۳. باغات مادری در بیرون از گلخانه در خاک طبیعی باع که عاری از نماتدهای *M. hapla*, *Meloidogyne arenaria*, *R. necatrix*, *A. mellea*, *V. dahliae*, *Longidorus* spp., *Xiphinema* spp. بوده و به تائید سازمان حفظ نباتات رسیده، احداث می شوند.
۴. تعیین فاصله حریم امن (قدان منابع آلوده گیاهی) برای باغات مادری به نوع استفاده از باع، بیماریهای قابل انتقال و برد پروازی حشرات ناقل بستگی دارد. در مورد هلو و شلیل، حریم امن باغات ۱۰۰۰ متر تعیین می شود.
۵. جهت اطمینان از عدم انتقال بیماریهای خاکزی، باید آبیاری از نوع تحت فشار باشد و توسط لوله های آبیاری مستقیماً از منبع تامین آب به زمین اصلی متصل گردد.
۶. همه درختان مادری ضمن ارزیابی چشمی مرتب (۲-۳ بار در سال در اواخر بهار و اواسط تابستان) از نظر سلامت عمومی (عدم وجود علائم بیماری) در برابر پتوئن ها و بیماری های خاکبرد و هوابرد نظیر *R. necatrix*, *Phytophthora* spp., *A. mellea*, *V. dahliae* و شانکریاکتریایی، باید سالیانه یکبار از نظر عدم آلودگی به ویروس های PPV, PNRSV, PDV TRSV,, ACLSV, ApMV, ArMV, CLRV ToRSV و هر پنج سال یکبار از نظر عدم آلودگی به ویروس های *Pratylenchus vulnus* *Longidorus* spp. مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گیرند. در صورت مشاهده آلودگی ضروری است درخت (درختان) آلوده حذف و با درخت سالم جایگزین شود.
۷. با توجه به انتقال تعدادی از ویروس های گیاهی از طریق بذر، باغات مادری بجز باغاتی که برای بذرگیری مورد استفاده قرار میگیرند، نباید به مرحله گلدهی برسند.


۳. نهال گواهی شده (Certified):

به نهالی اطلاق می شود که اصالت، سلامت و مشخصات ظاهری آن مطابق با استانداردهای مصوب بوده و مواد اولیه آن از باغات مادری

تهیه می شود.

توضیحات:

۱. پایه و پیوند ک باید متجانس و از ارقام تجاری شناخته شده بوده و عمل پیوند در زمان مناسب انجام شده باشد.
۱. نهال گواهی شده باید عاری از ویروسهای ToRSV, PPV, PNRSV, PDV, *Pseudomonas syringae*, باکتری *M. arenaria*, *Meloidogyne hapla* *Xiphinema* spp., *Pratylenchus vulnus* *Longidorus* spp. و قارچهای *R. necatrix*, *A. mellea*, *Phytophthora* spp., *V. dahliae*, *M. incognita* *javanica* باشند.
۲. نهالستان ما باید از سایر منابع آلودگی ۱۰۰۰ متر فاصله داشته باشند.



جدول ۱) بیماریهای قابل انتقال هلو و شلیل

عامل بیماری	انتقال	دامنه میزبانی
<i>Tobacco ringspot 'nepovirus</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد (Xiphinema spp.) خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر (%۳-۱۰۰)	بیش از ۱۷ خانواده گیاهی تک لپه ای و دولپه ای (شامل هسته داران، سیب، انگور، پاپایا، سویا، لوپین، توتون، نعناع، شفاقی، زبق، گلابیول، شمعدانی، زبان گنجشک، American Elderberry (sambucus spp.) Blackberry، Blueberry، dogwood (Cornus florida) Petunia ،Vigna spp. Phaseolus spp. (Rubus fruticosus) Chenopodium spp. Capsicum spp. sp.
<i>Apple chlorotic leaf 'spot trichovirus'</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و هسته داران، خانواده های Chenopodiaceae و Legominoceae
<i>'Apple mosaic ilarvirus</i>	مواد گیاهی آلوده	دانه داران و هسته داران، خانواده های رزا سه و کوکوریتاسه
<i>Arabis mosaic 'nepovirus</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد (Xiphinema spp.) خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر	اکثر تک لپه ایها و دولپه ایها (شامل تمشک، توت فرنگی، خیار، کاهو، کرفس، Forsythia intermedia, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Rhubarb (Rheum rhabarbarum)
<i>Prune dwarf ilarvirus^۱</i>	مواد گیاهی آلوده، دانه گرده، بذر (بیش از ۸۰٪)	دامنه میزبانی وسیع (شامل هسته داران، کوکوریتاسه و در مجموع ۱۵ خانواده از دولپه ایها)
<i>Prunus necrotic ringspot ilarvirus^۱</i>	مواد گیاهی آلوده، دانه گرده، بذر (بیش از ۷۰٪)	دامنه میزبانی وسیع (شامل هسته داران، بادام، رازک و در مجموع ۲۱ خانواده از دولپه ایها)
<i>Plum pox potyvirus^۱</i>	مواد گیاهی آلوده، شته ها، بذر	هسته دارن، بادام، درختان زیستی
<i>Tomato ring spot virus^۱</i>	مواد گیاهی آلوده، نماتد (Xiphinema spp.) خاک و آب آلوده، دانه گرده، بذر	بیش از ۳۵ خانواده گیاهی متعلق به تک لپه ایها و دولپه ایها (شامل هسته داران، کوکوریتاسه، گیاهان زیستی، انگور، توتون، توت فرنگی، Raspberry، Vigna ، Chenopodium spp. Phaseolus spp. Blackberry Petunia spp. spp.
<i>Phytophthora spp^۱</i>	خاک آلوده، آب آلوده، قلمه های آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع
<i>V. dahliae^۱</i>	خاک آلوده، آب آلوده، قلمه های آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع



^۴ پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه <i>A. mellea</i>	خاک و آب آلوده، نهال های آلوده، قطعات گیاهی آلوده و ادوات کشاورزی	دامنه میزبانی بسیار وسیع
^۵ پوسیدگی رزلینیایی ریشه <i>Rosellinia necatrix</i>	خاک و آب آلوده، نهال های آلوده، مواد گیاهی آلوده و ادوات کشاورزی	بسیار وسیع (۱۷۰ گونه گیاهی در ۶۳ جنس و ۳۰ خانواده)
^۶ <i>Pseudomonas syringae</i> (شانکر باکتریایی)	خاک و آب آلوده، نهال های آلوده، مواد گیاهی آلوده و ادوات کشاورزی	دانه داران، هسته داران، دانه ریر، مرکبات، غلات، لگومینوزه و ...
^۷ <i>Meloidogyne . hapla</i> <i>M. arenaria</i> <i>M. incognita</i> <i>M. javanica</i>	خاک	پلی فاز
^۸ <i>Longidorus</i> spp.	خاک	پلی فاز
^۹ <i>Pratylenchu</i> spp	خاک	پلی فاز
^{۱۰} <i>Xiphinema</i> spp	خاک	پلی فاز
^{۱۱} Almond witche's broom	مواد گیاهی آلوده، زنجر کها	دامنه میزبانی وسیع

توضیحات:

^۱ روش های ردیابی: الایزا و روش های بیولوژیک و در صورت نیاز روش های مولکولی

^۲ روش های ردیابی: بررسی ظاهری و در صورت نیاز تله گذاری واستفاده از محیط های کشت اختصاصی

^۳ روش های ردیابی: بررسی ظاهری و در صورت نیاز استفاده از محیط های کشت و آزمون خاک از نظر وجود میسلیوم و اسکلروت

^۴ و ^۵ روش های ردیابی: بررسی ظاهری اندام های هوایی، طوفه و ریشه

^۶ روش های ردیابی: جداسازی از بافت های گیاهی مشکر ک

^۷ روش های ردیابی: استفاده از PCR با پرایمرهای پوینرسال

